

Tabelle 1: Gesamtzahlen der im Untersuchungsgebiet beobachteten Rast- und Gastvögel

	Bewertung nach Burdorf et al. (1997) für W/M				Begehungstermine Herbst 2002 bis Frühjahr 2003															
	lok	reg	land	nat	17.07.	20.08.	08.09.	23.09.	10.10.	25.10.	12.11.	29.11.	10.12.	20.12.	08.01.	24.01.	10.02.	26.02.	09.03.	27.03.
Alpenstrandläufer	830	1650	3300	6000				37	3	20										6
Austernfischer	610	1250	2450	4100	8														18	14
Bachstelze						25														
Bartmeise											17				9					
Bekassine	75	150	300	-		218	15	124	2	16	28							3	4	
Blässhans	350	700	1400	3000						3										
Blässhuhn	50	100	200	2500		2	4													
Blauehlchen																				5
Brandgans	220	440	880	2000	8	4		4	4	12						4	8	7	18	
Fasan																		1		1
Feldlerche																		3	BP	BP
Flußseeschwalbe	45	90	180	220	4															
Flußuferläufer						1														
Gänsesäger	15	30	60	250							17		3			61	95	74	74	34
Graugans	85	170	330	600					10	127	122	43	124			190	222	118	16	3
Graureiher	100	200	400	-		3	1	1	1	1	3	3		2		1	7	17	2	4
Großer Brachvogel	240	420	940	1100	3	16		2				54	1				23	3	52	32
Haubentaucher	10	15	30	200		1														
Heringsmöwe	120	240	480	630		1														
Kiebitz	690	1400	2750	5000	1	63	4	26		31	84	5					1	>10	>12BP	
Kiebitzregenpfeifer	180	370	730	940				1												
Kormoran	25	50	100	400		2	1	5	2	2	1					4	18	2	29	23
Kornweihe											2			1		2	1	2	1	2
Krickente	65	130	260	400		63	52	280	14	32	62	8			4				7	6
Lachmöwe	410	830	1650	3000	11	5	11	24	50	7	45									17
Mäusebussard													1	1				2		1
Nonnengans	210	420	840	1000	1	1				5	1									
Pfeifente	220	440	870	2000		367	13	195	230	850	430	276		206	1	4	194	1450	263	
Rabenkrähe						1	2	2		5				1	3		3	3		6
Rauhfußbussard											1									
Reiherente	20	40	80	2500												5	48			
Rohrdommel																		1		
Rohrweihe					1		1													
Rotschenkel	50	95	190	210	15															
Säbelschnäbler	70	140	270	310	4	5		17	6	18										1
Sandregenpfeifer	25	50	95	140																6
Schnatterente	-	5	10	120	19	21			3										2	
Silbermöwe	360	730	1450	1500	1											1		1		
Sperber								1												
Star						70	50	50	120	70										>50
Stieglitz						25			20											
Stockente	500	1000	2000	5000	9	211	8	26	78	37	130	42		6		16	>60	34	5	6
Sturmmöwe	100	210	410	700			1		45			470								65
Turmfalke														1	2		1	1		
Uferschnepfe	75	150	300	-		1												2	31	>5BP
Wacholderdrossel											x				2				>50	
Waldwasserläufer						2														
Wanderfalke										1										
Zwergsäger	-	5	10	150						4	2	6			4	34	17	12		
Zwergtaucher						1		1												

Bewertungsstufen nach Burdorf et al. (1997)

- Landesweite Bedeutung
- Regionale Bedeutung
- Lokale Bedeutung
- Knapp unterhalb Bewertungsschwelle

BP = Brutpaare bzw. Reviere
x = vertreten

Anmerkung

Die Tabelle soll einen Überblick über das Rast- und Gastgeschehen im Untersuchungsgebiet geben. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. So wurden "Allerweltsarten" wie z.B. Kohl- und Blaumeisen nicht aufgeführt. Arten wie Wacholderdrossel und Bachstelze wurden nur bei auffälligen Trupfstärken verzeichnet. Möwen sind u.U. an Tagen, an denen nur einzelne Individuen vertreten waren, nicht vermerkt. Wasser- und Watvögel sind vollständig verzeichnet. Damit sind alle für das Untersuchungsgebiet wertgebenden Arten und Gesamtzahlen der Tabelle zu entnehmen.